



**Nombre científico:** *Heterotheca villosa*

**Nombre común:** Aster dorado, Aster dorado peludo falso

**Familia:** Asteraceae (Sunflower/Girasol)

**Nativa de:** CO, Oeste, Alto Medio Oeste

**Hábitat:** llanuras, estribaciones, laderas rocosas, márgenes de bosques, dunas, matorrales

Esta planta perenne de larga floración y raíz pivotante prospera en suelos bien drenados y en condiciones de sequedad. Es una fuente de néctar y polen para las abejas y las mariposas. Se puede volver a sembrar con facilidad; es de esperar que se extienda. Combinar con salvia con flecos (*Artemisia frigida*), trébol de pradera púrpura (*Dalea purpurea*), flor de manta (*Gaillardia aristata*), flor cónica de la pradera (*Ratibida columnifera*), hierba mariposa (*Asclepias tuberosa*) e higo chumbo de las llanuras (*Opuntia polyacantha*).

**Tipo de planta:** perenne (se puede volver a sembrar profusamente)

**Elevación:** a 3200 m

**Zona de rusticidad del USDA:** 3

**Exposición:** pleno sol

**Suelo:** pobre, estéril; bien drenado (prefiere arenoso o de grava)

**Humedad:** seca, xérica

**Color de la flor:** amarillo

**Tiempo de floración:** finales de la primavera a principios del otoño

**Tamaño en la madurez (alto x ancho):** 30 cm x 51 cm



**Propagación:** guardar las semillas secas a 4 °C. Sembrar después de la última helada in situ o en células. Cubrir ligeramente y mantener húmeda. Las semillas germinan a 21 °C y a temperaturas superiores.

