

Nombre científico: *Ratibida columnifera*, *R. columnaris* var. *pulcherrima*

Nombre común: flor de la pradera, sombrero mexicano

Familia: Asteraceae (Sunflower/Girasol)

Nativa de: CO, Oeste, Medio Oeste, Este

Hábitat: praderas, llanuras, praderas, colinas, bordes de carreteras

Esta planta perenne de larga floración, tolerante a la sequía y fácil de cultivar, ofrece néctar a las abejas, mariposas y otros insectos, y semillas a las aves. Combinar con otras perennes nativas como Susan de los ojos negros (*Rudbeckia hirta*), flor de manta (*Gaillardia aristata*), hierba mariposa (*Asclepias tuberosa*), pluma alegre de puntos (*Liatris punctata*), flor de la pradera de hoja estrecha (*Echinacea angustifolia*), trébol de pradera púrpura (*Dalea purpurea*), Aster dorado peludo (*Heterotheca villosa*) y Zinnia de pradera (*Zinnia grandiflora*).

Tipo de planta: perenne (de corta duración; resiembra)

Elevación: gama nativa a 2743 m

Zona de rusticidad del USDA: 4

Exposición: pleno sol


Suelo: arcilla, marga, arena (no es exigente; prefiere un buen drenaje)

Humedad: moderada, baja, seca, xérica

Color de la flor: amarillo, naranja, rojo ladrillo, granate

Tiempo de floración: verano

Tamaño en la madurez (alto x ancho): 30-76 cm x 30-46 cm



Propagación: fácil de cultivar a partir de semillas. Sembrar las semillas en el exterior en otoño o estratificarlas en frío (húmedo, 4 °C) durante 90 días. Sembrar, cubrir ligeramente. Las semillas germinan de 8 a 21 días a 21 °C. Las plantas cultivadas con semillas pueden florecer el primer o segundo año.



Wild Ones
NATIVE PLANTS, NATURAL LANDSCAPES
WILD ONES FRONT RANGE CHAPTER